Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:26

Link do produktu: https://sklep.kawon.com.pl/httpssklepkawoncomplbez-czarny-kwiat-50g-p-2html-p-2.html




# Bez czarny kwiat 50g

| | |
|---|---|
| Cena | **6,50 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Kod producenta | **0103** |
| Kod EAN | **5909994335417** |
| PKWiU | **21.20.13.0** |

Opis produktu

**KWIAT BZU CZARNEGO -** *Sambuci flos*

zioła do zaparzania, 1g/g

**Zawartość opakowania:** 50 g

**Skład:** 1 g produktu leczniczego zawiera 1 g *Sambucus nigra L., flos* (kwiat bzu czarnego).

**Wskazania do stosowania:** Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu złagodzenia wczesnych objawów przeziębienia. Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

**Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na kwiat bzu czarnego.

**Interakcje:** Nieznane.

**Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:** Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat. W przypadku nasilenia objawów lub gdy wystąpią duszność, gorączka albo ropna plwocina należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane należy

skonsultować się z lekarzem.

**Ciąża i karmienie piersią:** Ze względu na brak wystarczających danych stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:** Brak badań.

**Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:** Doustnie. Młodzież od 12 lat, dorośli i osoby starsze:1 łyżkę (3,0g) kwiatu bzu czarnego zalać 1 szklanką (200 ml) wrzącej wody, naparzać pod przykryciem 5-10 minut, przecedzić. Pić szklankę ciepłego naparu 3 razy dziennie. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

**Czas stosowania:** Leku nie należy stosować dłużej niż tydzień (7dni). Jeżeli objawy utrzymują się pomimo stosowania produktu leczniczego należy skontaktować się z lekarzem.

**Przedawkowanie:** Nie odnotowano żadnych przypadków przedawkowania. W razie zastosowania dawki większej niż zalecana i wystąpienia niepokojących objawów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Pominięcie zastosowania leku:** Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

**Działania niepożądane:** Nieznane. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309), e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

**Warunki przechowywania:** Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30□°C, chronić od światła, wilgoci, i wpływu obcych zapachów. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.

**Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

**Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:** IL-3354/LN

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.