Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:25

Link do produktu: https://sklep.kawon.com.pl/borowka-brusznica-lisc-50-g-p-42.html



Borówka brusznica liść 50 g

Cena	**6,10 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Kod producenta	**0405**
Kod EAN	**5909991240448**
PKWiU	**21.20.13.0**

Opis produktu

LIŚĆ BORÓWKI BRUSZNICY - *Vitis idaeae folium*

Postać farmaceutyczna: Zioła do zaparzania

Skład: 100 g produktu zawiera 100g liścia borówki brusznicy

Zawartość opakowania: 50 g

Działanie i wskazania do stosowania: Odkażające drogi moczowe w łagodnych stanach zapalnych dróg moczowych.

Przeciwwskazania: Choroby wątroby, bóle brzucha o nieustalonej przyczynie, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy.

Specjalne środki ostrożności: Nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 roku życia z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania. Nie stosować dłużej niż kilka dni. W przypadku nieustąpienia objawów w ciągu kilku dni od momentu rozpoczęcia stosowania produktu leczniczego lub ich nasilenia należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane: Przy nadwrażliwości żołądka mogą wystąpić nudności i

wymioty.

Interakcje: Nie należy stosować wraz z środkami zakwaszającymi mocz, gdyż może to osłabić działanie.

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na kierowanie pojazdami i obsługę maszyn: Nieznany.

Sposób stosowania i droga podania: 1 łyżkę (2,0g) liści zalać szklanką (200 ml) letniej wody, ogrzewać powoli do wrzenia, łagodnie gotować pod przykryciem 5 minut, przecedzić.

Pić po ½ szklanki (100 ml) odwaru 2 razy dziennie. Pić zawsze świeżo przygotowany odwar.

Warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL3333/LN

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.