



## Borówka czernica owoc 25g

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Cena           | <b>6,50 zł</b>            |
| Dostępność     | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Kod producenta | <b>0506</b>               |
| Kod EAN        | <b>5909990021093</b>      |
| PKWiU          | <b>21.20.13.0</b>         |

### Opis produktu

OWOC BORÓWKI CZERNICY - Myrtilli fructus siccus

zioła do zaparzania, 1g/1g

Zawartość opakowania: 25g

Skład: 1g produktu leczniczego zawiera 1gVaccinium myrtillus L., fructus (owoc borówki czernicy, suchy)

Wskazania do stosowania: Napar stosowany jest wspomagająco w biegunkach.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na owoc borówki czernicy.

Interakcje: Nie stosować łącznie z lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna i pochodne), lekami zawierającymi kwas acetylosalicylowy, ponieważ zwiększa się ryzyko krwawień.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: W przypadku wystąpienia bólów brzucha, gorączki, nudności, wymiotów, stwierdzenia obecności w stolcu śluzu, ropy, krwi lub wystąpienia innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli objawy nasilią się lub nie ustąpią po 1-2 dniach stosowania produktu należy skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania u dzieci, biegunkę u dzieci powinien leczyć lekarz.

Ciąża i karmienie piersią: Brak danych dotyczących bezpieczeństwa, dlatego nie zaleca się stosowania w

---

okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie prowadzono żadnych badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność kierowania pojazdami i obsługę maszyn

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 łyżkę (4 g) owoców borówki czernicy zalać szklanką (200 ml) wrzącej wody, naparzać pod przykryciem lub w termosie 20 minut. Pić po 1 szklance naparu 2 – 3 razy dziennie. Stosować zawsze świeży napar.

Przedawkowanie: W razie zastosowania dawki większej niż zalecana i wystąpienia niepokojących objawów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku: Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych: Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309), e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl). Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż o 30°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

ZAKŁAD ZIELARSKI „KAWON-HURT” Nowak Sp.J.

---

KRAJEWICE 119 63-800 GOSTYŃ

tel/fax 65 572 08 22, 65 572 34 60

e-mail: [kawon@kawon.com.pl](mailto:kawon@kawon.com.pl)

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-2314/LN

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.