



Skrzyp ziele Express 30x2g

Cena	5,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Kod producenta	0807
Kod EAN	5909990213153
PKWiU	21.20.13.0

Opis produktu

ZIELE SKRZYPU Equiseti herba

2g/saszetkę, ziola do zaparzania w saszetkach

Skład: Jedna saszetka (2 g) produktu leczniczego zawiera 2 g Equisetum arvense L., herba (ziele skrzypu).

Zawartość opakowania: 30 saszetek po 2 g

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:

Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli: 1 saszetkę ziela skrzypu zalać 1 szklanką (250 ml) wrzącej wody, naparzać pod przykryciem 15 minut. Pić po 1 szklance naparu 3 razy na dobę. Stosować zawsze świeży napar.

Dawka dobową leku: 3 pojedyncze dawki.

Maksymalna dawka dobową leku: 4 pojedyncze dawki

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Nie stosować po upływie terminu ważności

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zakład Zielarski „KAWON-HURT” Nowak Sp.J.

Krajewice 119

63 - 800 Gostyń

tel./fax 65 572 08 22, 65 572 34 60

e-mail: kawon@kawon.com.pl

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-1026/LN

Kategoria dostępności:

OTC - Lek wydawany bez recepty

Wskazania do stosowania:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany pomocniczo w łagodnych dolegliwościach układu moczowego, jako środek zwiększający ilość wydalanego moczu i poprawiający przepływ w drogach moczowych.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na ziele skrzypu oraz schorzeniach, w których wskazane jest przyjmowanie zmniejszonej ilości płynów (np. w ciężkich chorobach serca lub nerek).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Jeśli dolegliwości nasilą się, nie ustąpią lub pojawią się objawy, którym towarzyszyć będą gorączka, bolesne i utrudnione oddawanie moczu lub obecność krwi w moczu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Interakcje:

Brak doniesień.

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na brak wystarczających danych stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie badano wpływu produktu leczniczego na kierowanie pojazdami i obsługę maszyn.

Czas stosowania:

Lek stosuje się tradycyjnie przez okres od 2 do 4 tygodni. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż jeden tydzień podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie:

Nie odnotowano przypadków przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku:

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty

Działania niepożądane:

Łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz reakcje alergiczne (np. wysypka). Częstość występowania tych objawów nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309), e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.