



## Wierzba kora 50g

Cena	<b>4,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Kod producenta	<b>0706</b>
Kod EAN	<b>5909990013319</b>
PKWiU	<b>21.20.13.0</b>

### Opis produktu

KORA WIERZBY – Salicis cortex

Postać farmaceutyczna: zioła do zaparzania

Zawartość opakowania: 50g

Skład: kora wierzby (Salicis cortex)

Wskazania do stosowania: Stosuje się w objawowym leczeniu gorączki i bólu oraz w łagodnych bólach reumatycznych.

Działanie: Przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany lub leki z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych. Nie zaleca się stosowania kory wierzby w astmie oskrzelowej, ponieważ preparat może nasilać przebieg choroby. Nie stosować u dzieci.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: W przypadku chorób nerek lub wątroby, w problemach z krzepliwością oraz u pacjentów z wrzodami żołądka i dwunastnicy oraz niedoborem dehydrogenazy glukozo6fosforanowej, stosować produkt wyłącznie pod kontrolą lekarską. Jeżeli gorączka nie ustąpi po 3 dniach leczenia lub przekroczy wartość 39oC, należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli bóle reumatyczne nie ustąpią lub nasilą się w ciągu tygodnia stosowania, należy skonsultować się z lekarzem.

---

Interakcje: Ze względu na obecność salicyny mogą wystąpić interakcje podobne jak w przypadku salicylanów. Napar z kory wierzby może nasilać działanie niesterydowych leków przeciwzapalnych i środków przeciwzakrzepowych.

Sposób stosowania i droga podania: Odwar – 3 płaskie miarki ( 4 g) rozdrobnionej kory zalać 1 szklanką (200 ml) gorącej wody i gotować pod przykryciem 15 minut. Odstawić na 15 minut i przecedzić. Pić po posiłkach 3 razy dziennie po szklance ciepłego, świeżo przygotowanego odwaru.

Dawkowanie: Dorośli dobowo: 12,0g kory wierzby, co odpowiada 240 mg glikozydów fenolowych w przeliczeniu na salicynę

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia: Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn: Nie znany

Działania niepożądane: Możliwość wystąpienia reakcji alergicznych. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i poinformować o nich lekarza.

Przedawkowanie: Dotychczas brak doniesień.

Warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30oC, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: R/0133

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.